

**สรุปองค์ความรู้ในการป้องกันการปฏิบัติและการดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้า**

1.โรคพิษสุนัขบ้า+การปฏิบัติตามลักษณะของสัตว์ที่สัมผัสและสาเหตุที่ถูกกัด

- 1.1 ถูกต้องตัวสัตว์หรือป้อนน้ำป้อนอาหารผิวหนัง ไม่มีแผลหรือรอยถลอก
- 1.2 ถูกเลียสัมผัสน้ำลายหรือเลือดสัตว์ผิวหนัง ไม่มีแผลหรือรอยถลอก

1. ไม่ต้องฉีด

1.3 ถูกจับ/ข่วนและเป็นรอยหรือมีเลือดออกไหม้??

สัตว์ขังอยู่ในบ้าน/ในกรง  
ฉีดวัคซีนต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี  
ล่าสุดไม่เกิน 1 ปี  
มีเหตุให้สัตว์ตกใจแล้วกัด

- 2.1 ถูกจับเป็นรอยข่วนที่ผิวหนัง ไม่มีเลือดออก
- 2.2 ถูกข่วนที่ผิวหนัง ไม่มีเลือดออกหรือเลือดออกช้ำๆ
- 2.3 ถูกเลีย น้ำลายถูกผิวหนังที่มีแผล รอยถลอก รอยขีดข่วน
- 2.4 กัดเนื้อสัมผัสสัตว์ที่สงสัยโดยไม่ได้ทำให้สก

2. ต้องฉีด PCEC

- 3.1 ถูกกัดถูกข่วนเป็นแผลเดียวหรือหลายแผลและมีเลือดออก
- 3.2 ถูกเลีย หรือน้ำลายถูกเยื่อเมือก ตา ปาก
- 3.3 มีแผลที่ผิวหนังและสัมผัสเนื้อสมองสัตว์และ/หรือซ้ำแผลจากสัตว์

- 3. ฉีด PCEC และ ERIC/HRIC
- 4. ล้างทำความสะอาด

- 1.ล้างแผลด้วยน้ำฟอกสบู่หลายครั้ง
- 2.ถ้าเช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
- \*\*ช่วยลดอัตราการเกิดโรคได้ถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์\*\*

1. สุนัข แมว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ กัด/สัมผัสน้ำลาย

- \*\*อย่างน้อย 3 เข็ม
- ไม่เกิน 6 เดือน ฉีด 0 (1 dose: 1 จุด)
- เกิน 6 เดือน ฉีด 0, 3 (2 dose: 1 จุด)

ID: 0, 3, 7, 30 วัน (2 จุด)

อยู่ในรอนัด ฉีดตามปกติ

ไม่จบ/ไม่เคยฉีด

IM: 0,3,7,14,30 วัน

- 1.เด็ก<6ปี (<2ปี ฉีด Vastus lateralis, 2-<6 ปี ฉีด deltoid)
- 2. ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ-บกพร่อง

เลยรอนัด เริ่มต้นฉีดใหม่

วิธีการฉีด IM ID

2. เกณฑ์พิจารณาการฉีดวัคซีน

8. Pre-exposure prophylaxis rabies PrEP

- อย่าเหยียบ
- อย่าเอื้อม
- อย่าขยี้
- อย่าหนี
- อย่าวิ่ง

7. การป้องกันสุนัขกัด

6. การให้ยารักษา  
Amoxy 250-500 2\*2 หรือ 1\*3PC# 3-5 วัน  
\*\* หากแพ้ pen ให้??? 1\*2 pc paracet IT, TAT

6. การให้ยารักษา

\*\*อย่าขยี้แผล  
\*\*ยกเว้นแผลมีขนาดใหญ่ มี active bleed ให้ขยี้หลวมๆ ได้

5. การเย็บแผล

\*\* สีมหระดับ 3:  
- มีบาดแผลลึกขนาดมีเลือดออกชัดเจน หรือลึกหรือหลายแผล  
- น้ำลายสัมผัสเย็บ  
++ ไม่เคยฉีดหรือได้วัคซีนไม่ครบ (3 dose) ++

4. passive immunization: Eric/Hric

ข้อบ่งชี้

แพ้ Eric / ไม่ต้อง test

Hric

ขนาด 20 IU/kg

บาดแผลที่เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อสูง  
skin test??  
ฉีดในแผลและรอบๆ แผล  
ขนาด 40 IU/kg  
วิธีการฉีด

3. active immunization: rabies vaccine (PCEC)